


F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis


- *Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt?*



A


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*



F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? **Nematoden**

Wie lautet der gebräuchliche/umgangssprachliche Name für die Nematoden?

A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? **Nematoden**

Wie lautet der gebräuchliche/umgangssprachliche Name für die Nematoden?

Der Fadenwurm

F


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt?
 - 1)
 - 2)
 - 3)

A


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt?
 - 1) *Baylisascaris*
 - 2) *Ancylostoma*
 - 3) *Toxocara*

F


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? *Welcher ist die häufigste Ursache?*
 - 1) *Baylisascaris?*
 - 2) *Ancylostoma?*
 - 3) *Toxocara?*


A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? *Welcher ist die häufigste Ursache?*
 - 1) *Baylisascaris – am häufigsten*
 - 2) *Ancylostoma*
 - 3) *Toxocara*


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



Baylisascaris procyonis (der Waschbären-Spulwurm)

F


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? *Welcher ist die häufigste Ursache?*
 - 1) *Baylisascaris – am häufigsten*
 - 2) *Ancylostoma*
 - 3) *Toxocara*
- Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h., wie viele Würmer sind typischerweise beteiligt?



A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? *Welcher ist die häufigste Ursache?*
 - 1) *Baylisascaris – am häufigsten*
 - 2) *Ancylostoma*
 - 3) *Toxocara*
- Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h., wie viele Würmer sind typischerweise beteiligt? *Einer – es befindet sich ein einzelner Wurm im Körper*


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



DUSN

F


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? *Welcher ist die häufigste Ursache?*
 - 1) *Baylisascaris – am häufigsten*
 - 2) *Ancylostoma*
 - 3) *Toxocara*
- Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h. wie viele Würmer sind typischerweise beteiligt? *Einer – es befindet sich ein einzelner Wurm im Körper*
- Wie wird DUSN behandelt?



A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? *Nematoden*
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? *Welcher ist die häufigste Ursache?*
 - 1) *Baylisascaris – am häufigsten*
 - 2) *Ancylostoma*
 - 3) *Toxocara*
- Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h. wie viele Würmer sind typischerweise beteiligt? *Einer – es befindet sich ein einzelner Wurm darin*
- Wie wird DUSN behandelt? *Das subretinale Tierchen mit dem Laser entfernen (sofern Sie es finden können)*

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



Wurm




Gebratener Wurm nach
Laserbehandlung

DUSN

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? Nematoden
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? Welcher ist die häufigste Ursache?
 - 1) Baylisascaris – am häufigsten
 - 2) Ancylostoma
 - 3) Toxocara
- Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h. wie viele Würmer sind
Wie stehen die Chancen, den Wurm zu lokalisieren?

Wurm darin
er entfernen

A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? Nematoden
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? Welcher ist die häufigste Ursache?
 - 1) Baylisascaris – am häufigsten
 - 2) Ancylostoma
 - 3) Toxocara
- Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h. wie viele Würmer sind


Wie stehen die Chancen, den Wurm zu lokalisieren?

Etwa 50:50

Wurm darin
er entfernen

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? Nematoden
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? Welcher ist die häufigste Ursache?
 - 1) Baylisascaris – am häufigsten
 - 2) Ancylostoma
 - 3) Toxocara


• Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h. wie viele Würmer sind
Wie stehen die Chancen, den Wurm zu lokalisieren?
Etwa 50:50

Sie vermuten stark, dass es sich um DUSN handelt – können aber keinen
Wurm finden. Wie sollten Sie vorgehen?

Wurm darin
er entfernen

A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Welche Erregerklasse ist an der DUSN beteiligt? Nematoden
- Welche drei Nematoden sind am häufigsten an DUSN beteiligt? Welcher ist die häufigste Ursache?
 - 1) Baylisascaris – am häufigsten
 - 2) Ancylostoma
 - 3) Toxocara

• Wie hoch ist die Infektionslast bei DUSN, d. h. wie viele Würmer sind
Wie stehen die Chancen, den Wurm zu lokalisieren?
Etwa 50:50

Sie vermuten stark, dass es sich um DUSN handelt – können aber keinen
Wurm finden. Wie sollten Sie vorgehen?


Ziehen Sie eine kurze, aber intensive systemische Antihelminthika-Therapie in
Betracht – sie könnte den Wurm bewegungsunfähig machen und ihn dadurch
leichter auffindbar machen

Wurm darin
er entfernen

F


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?*



A


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*

1)


(dieses Stadium tritt zuerst auf)

2)




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2)

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



DUSN: Akutes Stadium

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




A/Q

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) *(dann diese)*



A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



DUSN: Spätstadium

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft...

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu Sehstörungen führt...

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu verminderter Sehschärfe führt... Vitritis...

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu verminderter Sehschärfe führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen...

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu verminderter Sehschärfe führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken.

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu verminderter Sehschärfe führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken. Welche allgemeine Krankheitsgruppe fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?

A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis




- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu verminderter Sehschärfe führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken. Welche allgemeine Krankheitsgruppe fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?

White-Dot-Syndrom. Wenn Sie mit einem Patienten konfrontiert sind, bei dem ein WDS vermutet wird, sollten Sie stets in Betracht ziehen, dass es sich um DUSN handeln könnte!

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- *Wer ist der typische DUSN-Patient? Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener*
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.


Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu verminderter Sehschärfe führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken. Welche allgemeine Krankheitsgruppe fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?

White-Dot-Syndrom. Wenn Sie mit einem Patienten konfrontiert sind, bei dem ein WDS vermutet wird, sollten Sie stets in Betracht ziehen, dass es sich um DUSN handeln könnte!

White-Dot-Syndrome werden in der Folienreihe R16 behandelt

F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitritis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome


Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu Sehstörungen führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken. Welche allgemeine Krankheitsgruppe fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?

White-Dot-Syndrome. Wenn Sie mit einem Patienten konfrontiert sind, bei dem ein WDS vermutet wird, sollten Sie stets in Betracht ziehen, dass es sich um DUSN handeln könnte!

Warum ist es so wichtig, bei WDS-Patienten an DUSN zu denken?

A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Wer ist der typische DUSN-Patient? Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome

Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu Sehstörungen führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken. Welche allgemeine Krankheitsgruppe fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?


White-Dot-Syndrome. Wenn Sie mit einem Patienten konfrontiert sind, bei dem ein WDS vermutet wird, sollten Sie stets in Betracht ziehen, dass es sich um DUSN handeln könnte!

Warum ist es so wichtig, bei WDS-Patienten an DUSN zu denken?

Weil DUSN geheilt werden kann, wenn die Diagnose in diesem Stadium gestellt wird

A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- Wer ist der typische DUSN-Patient? Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?

1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und


Hmm... Eine Erkrankung, die junge, gesunde Erwachsene betrifft... zu Sehstörungen führt... Vitritis... multiple kleine weißliche Läsionen... kann schwanken. Welche allgemeine Krankheitsgruppe fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?

White-Dot-Syndrom. Wenn Sie mit einem Patienten konfrontiert sind, bei dem ein WDS vermutet wird, sollten Sie stets in Betracht ziehen, dass es sich um DUSN handeln könnte!

Warum ist es so wichtig, bei WDS-Patienten an DUSN zu denken?

Weil DUSN geheilt werden kann, wenn die Diagnose in diesem Stadium gestellt wird. **Wenn Sie die Diagnose jedoch versäumen, schreitet die Erkrankung unaufhaltsam bis zum unheilbaren Spätstadium fort.**


F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung mit Veränderungen des RPE...


F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung mit Veränderungen des RPE... Blässe des Papillenrandes...


F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung mit Veränderungen des RPE... Blässe des Papillenrandes... ausgedünntes Netzhautgefäßsystem...

F


Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung mit Veränderungen des RPE... Blässe des Papillenrandes... ausgedünntes Netzhautgefäßsystem... schlechte Sehkraft.


F

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis



- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung mit Veränderungen des RPE... Blässe des Papillenrandes... ausgedünntes Netzhautgefäßsystem... schlechte Sehkraft. Welche spezifische Erkrankung fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?



A

Diffuse unilaterale subakute Neuroretinitis

- *Wer ist der typische DUSN-Patient?* Ein ansonsten gesunder Jugendlicher oder junger Erwachsener
- *DUSN verläuft in zwei Stadien – welche sind das?*
 - 1) Im **akuten** Stadium klagen die Patienten über verminderte Sehschärfe und Schmerzen. Die Untersuchung zeigt eine Vitreitis, ein Papillenödem und multiple kleine grau-weiße Netzhautläsionen. Die Anzeichen und Symptome schwanken.
 - 2) Im Spätstadium der Erkrankung ist das RPE depigmentiert, der Papillenrand ist blass und atrophisch, und die Netzhautgefäße sind verengt. Die Sehschärfe ist schlecht.

Hmm... Eine Erkrankung mit Veränderungen des RPE... Blässe des Papillenrandes... ausgedünntes Netzhautgefäßsystem... schlechte Sehkraft. Welche spezifische Erkrankung fällt Ihnen angesichts dieser Beschreibung ein?

Retinitis pigmentosa. Bei einem Fall von „einseitiger RP“ sollten Sie stets an DUSN denken.